



NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA BORÓWKA AMERYKAŃSKA

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

MEGAFOL 1,0-2,0L/ha* PLANTAFOL 30.10.10 2,0-2,5 kg/ha PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha KENDAL 1,5-2,0 L/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***	MC SET 2x1,5 L/ha PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha Enermax 2x0,5 kg/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***	MC CREAM 2x2,0 L/ha PLANTAFOL 5.15.45 2,0-2,5 kg/ha Ca Sprint 5,0 L/ha Lecicrop 2,0 L/ha** Eckosil 0,25-0,5 L/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***	MEGAFOL 1,0-2,0L/ha* PLANTAFOL 5.15.45 2,0-2,5 kg/ha Ca Sprint 5,0 L/ha Lecicrop 2,0 L/ha** Eckosil 0,25-0,5 L/ha	PLANTAFOL 0.25.50 2,0-2,5 kg/ha
				
Prawidłowy start i rozwój vegetacji. Przewyciężenie stresów środowiskowych. Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych.	MC Set stymuluje i wydłuża kwitnienie, poprawia zawiązywanie owoców i zapobiega opadaniu zawiązków.	MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Lecicrop ogranicza pękanie owoców, poparzenia słoneczne, wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie oraz zapobiega utracie wody podczas przechowywania.	Przewyciężenie stresów środowiskowych. Ca Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia, poprawia właściwości przechowalnicze.	Przygotowanie roślin do prawidłowego przezimowania. Dostarczenie składników pokarmowych po zbiorach wpływa na pąki kwiatowe w kolejnym sezonie.
Przed kwitnieniem	Kwitnienie	Wzrost zawiązków	Dojrzewania owoców	Po zbiorach

* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungycydami, herbicydami, insektycydami i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0-3,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad.

** LECICROP stosować w celu ochrony przed oparzeniami słonecznymi i chorobami grzybowymi. jednocześnie wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie, zabezpiecza przed nadmiernym wchłanianiem wody podczas opadów oraz poprawia właściwości przechowalnicze i transportowe. stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

*** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie dogłębowe:

VIVA 10L/ha na początku vegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku vegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.

RADIFARM 250ml/100 L wody moczenie sadzonek przed posadzeniem, podlewanie po posadzeniu. RADIFARM stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a przez to zdolność rośliny do absorbowania wody i składników odżywczych z gleby.