

NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA MALINA

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

MEGAFOL 1,0-2,0L/ha* PLANTAFOL 30.10.10 2,0-2,5 kg/ha PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha*** 	MEGAFOL 1,0-3,0L/ha* PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha KENDAL 1,5-2,0 L/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha*** 	MC SET 2x1,5 L/ha PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha Enermax 2x0,5 kg/ha Eckosil 0,25-0,5 L/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha*** 	MC CREAM 2x2,0 L/ha PLANTAFOL 5.15.45 2,0-2,5 kg/ha Ca Sprint 5,0 L/ha Lecicrop 2,0 L/ha** Eckosil 0,25-0,5 L/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha*** 	MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha PLANTAFOL 5.15.45 lub 0.25.50 2,0-2,5 kg/ha SWEET 2,0 L/ha Ca Sprint 5,0 L/ha Lecicrop 2,0 L/ha** Eckosil 0,25-0,5 L/ha 
Prawidłowy start i rozwój vegetacji. Przezwyciężenie stresów środowiskowych. Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych.	Stymulowanie naturalnej odporności roślin. Zapobieganie wystąpienia niedoborów składników pokarmowych.	MC Set stymuluje i wydłuża kwitnienie, poprawia zawiązywanie owoców i zapobiega opadaniu zawiązków. ENERMAX stosować na koniec kwitnienia, na początku zawiązywania owoców.	MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Lecicrop wspomaga ochronę przed chorobami, ogranicza uszkodzenia owoców, poparzenia słoneczne oraz zapobiega utracie wody podczas przechowywania.	Sweet zalecany w przypadku odmian deserowych w celu poprawienia smaku i jakości owoców. Ca Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia, poprawia właściwości przechowalnicze.
Początek vegetacji	Przed kwitnieniem	W trakcie kwitnienia	Po zawiązaniu pierwszych owoców	Dojrzewanie owoców

* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungycydami, herbicydami, insektycydami i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0-3,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad.

** LECICROP stosować w celu ochrony przed oparzeniami słonecznymi i chorobami grzybowymi. Jednocześnie wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie, zabezpiecza przed nadmiernym wchłanianiem wody podczas opadów oraz poprawia właściwości przechowalnicze i transportowe. Stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

*** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

VIVA 10L/ha na początku vegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku vegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.

RADIFARM 250ml/100 L wody moczenie sadzonek przed posadzeniem, podlewanie po posadzeniu. RADIFARM stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a przez to zdolność rośliny do absorbowania wody i składników odżywczych z gleby.