



NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA PORZECZKA / AGREST

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

MEGAFOL 1,0-2,0L/ha* PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 30.10.10 Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***	MEGAFOL 1,0-3,0L/ha* PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 20.20.20 KENDAL 1,5-2,0 L/ha Eckosil 0,25-0,5 L/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***	MC SET 2x1,5 L/ha PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 10.54.10 Enermax 2x0,5 kg/ha Eckosil 0,25-0,5 L/ha Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***	MC CREAM 2x2,0 L/ha PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 20.20.20 Ca Sprint 5,0 L/ha Lecicrop 2,0 L/ha** Eckosil 0,25-0,5 L/ha	MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 5.15.45 lub 0.25.50 Ca Sprint 5,0 L/ha Lecicrop 2,0 L/ha** Eckosil 0,25-0,5 L/ha
				
Prawidłowy start i rozwój wegetacji. Przewyciężenie stresu środowiskowych. Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych.	Stymulowanie naturalnej odporności roślin. Zapobieganie wystąpienia niedoborów składników pokarmowych.	MC Set stymuluje i wydłuża kwitnienie, poprawia zawiązywanie owoców i zapobiega opadaniu zawiązków. ENERMAX stosować na koniec kwitnienia, na początku zawiązywania owoców.	MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyn- tezy. Lecicrop wspomaga ochronę przed chorobami, ogranicza pęknięcie owoców, poparzenia słoneczne oraz zapobiega utracie wody podczas przechowywania.	Ca Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia, poprawia właściwości przechowalnicze. Eckosil poprawia właściwości przechowalnicze plonu podnosząc jego jędrność i masę.
Początek wegetacji	Przed kwitnieniem	W trakcie kwitnienia	Wzrost owoców	Dojrzewanie owoców

* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungycydami, herbicydami, insektycydami i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0-3,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad.

** LECICROP stosować w celu ochrony przed oparzeniami słonecznymi i chorobami grzybowymi. Jednocześnie wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie, zabezpiecza przed nadmiernym wchłanianiem wody podczas opadów oraz poprawia właściwości przechowalnicze i transportowe. Stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

*** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

VIVA 10L/ha na początku wegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku wegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.

RADIFARM 250ml/100 L wody moczenie sadzonek przed posadzeniem, podlewanie po posadzeniu. RADIFARM stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a przez to zdolność rośliny do absorbowania wody i składników odżywczych z gleby.